

- 46- Let X be an (absolutely) continuous random variable. then ,
1) the probability that X takes a given value of X is not known
2) the probability that X takes a given value of X equals one
3) the probability that X takes a given value of X equals to $f_X(x)$
4) the probability that X takes a given value of X equals to Zero

47- In statistical terms, a Can be any set or collection of objects.

- 1) set 2) number 3) population 4) sample

48- A sampling distribution is nothing more than the probability Function for the statistic.

- 1) mathematical 2) density 3) random 4) variable

49- For the mean test, the details differ, depending upon what we are able to make.

- 1) assumption 2) samples 3) sets 4) hypotheses

50- It is very often useful to compute , to compare variability between different sets of data.

- 1) mean deviation 2) variance
3) coefficient of deviation 4) standard deviation

51- Identify the level of measurement used in the following.

Ali, who is different in many ways, measures time in days, with 0 corresponding to his birth date. The day before his birth is -1, the day after his birth is +1, and so on. Ali has converted the dates of major historical events to his numbering system. What is the level of measurement of these numbers?

- 1) nominal 2) interval 3) ordinal 4) ratio

52- Human body temperatures have a mean of 98.20° and a variance of 0.64° .

An emergency room patient is found to have a temperature of 101° . Convert 101° to a z score. Is that temperature unusually high? What does it suggest?

- 1) 4.38, yes , patient is ill 2) 4.38, No , patient is not ill
3) 3.5, yes , patient is ill 4) 3.5, No , patient is not ill

53- Complete this sentence

The (also called the H test) is a nonparametric test that uses ranks of sample data from three or more independent populations. It is used to test the null hypothesis that the independent samples come from populations with the same distribution; the alternative hypothesis is the claim that the population distributions are different in some way.

- 1) Kruskal – Wallis Test 2) wilcoxon Rank – Sum Test
3) wilcoxon Signed - Rank Test 4) Rank correlation Test

54- which sentences is not correct?

- 1) standard deviation of population is often called the standard error of mean
2) the best point estimate of population proportion is sample proportion.
3) the sample mean is the best point of the population mean.

4) S^2 is the best point estimate of variance of population.

55- if two of the items shown below are randomly selected . find the probability that both items are colored green . this items are used in test of proportion.

Red , yellow , green , red , blue , green , yellow
Assume that non of the selected items is replace before the other are selected.

- 1) $\frac{4}{49}$ 2) $\frac{4}{42}$ 3) $\frac{2}{49}$ 4) $\frac{2}{42}$

آمار کاربردی

56- سطح زیر منحنی H_0 در آزمون فرض آماری همواره برابر است با:

- (1) سطح اطمینان آزمون
(2) خطای نوع دوم
(3) خطای نوع اول
(4) به تعریف H_0 بستگی دارد

57- در تحلیل واریانس یک عامله اگر تعداد تیمارها ۳ و $SST = 50$ و $SSE(T_r) = 18$ باشد $SS(T_r)$ با کدام یک از گزینه های ذیل برابر است ؟

- (1) ۶۸ (2) ۳۶ (3) ۳۲ (4) اطلاعات کافی نیست

58- در تحلیل واریانس دو عامله (باتاثیر متقابل) اگر تعداد تیمارها ۳ ، تعداد بلوکها ۵ و در هر سلول ۲ مشاهده وجود داشته باشد. آنگاه ناحیه بحرانی در سطح ۵ درصد برای فرض H_0' عبارت است از:

$$F_B \geq F_{0/25, 4, 15} = ? \quad (2) \quad F_B > F_{0/05, 3, 15} = ? \quad (1)$$

(4) هیچکدام $F_B \geq F_{0/5, 4, 15} = ? \quad (3)$

59- تفسیر $P(-25/1 \leq \mu_1 - \mu_2 \leq -6/7) = 0/95$ این است که در سطح خطای ۵ درصد می توان ادعا کرد :

- (1) $\mu_1 < \mu_2$
(2) $\mu_1 = \mu_2$
(3) $\mu_1 > \mu_2$
(4) اطلاعات برای اظهار نظر کافی نیست

60- توان آزمون برابر است با احتمال

- (1) رد H_0 وقتی که نادرست است
(2) رد H_1 وقتی که نادرست است
(3) قبول H_0 وقتی که درست است
(4) قبول H_1 وقتی که درست است

61- برای آزمون برابری میانگین سه جامعه نرمال یک نمونه ۵ تائی از هر جامعه انتخاب شده و اطلاعات زیر محاسبه شده است
مقدار آماره آزمون کدام است ؟

$$\bar{x}_1 = 5 \quad \bar{x}_2 = 10 \quad \bar{x}_3 = 15$$

$$S_1^2 = 9 \quad S_2^2 = 25 \quad S_3^2 = 41$$

$$F = 4 \quad (2) \quad F = 2/5 \quad (1)$$

$$F = 5 \quad (4) \quad F = 3/5 \quad (3)$$

۶۲- برای مشاهداتی ، معادله رگرسیون خطی برآورده به صورت $\hat{Y} = 10/25 + 0/7x_1 - 18/03x_2$ بوده است آیا فرض $B_1 = 0$ را در سطح معنی داری ۵ درصد می پذیرید؟ چرا؟

- (۱) بلی ، چون $7/0$ مقدار کوچکی است.
- (۲) خیر چون $7/0$ مقدار کوچکی نیست.
- (۳) برای پاسخ نیاز به k و n داریم .
- (۴) جواب به خطای معیار b_1 و تعداد مشاهدات بستگی دارد.

۶۳- اگر $\sum(y - \bar{y})^2 = \sum(y - \bar{y})^2$ باشد آنگاه ضریب همبستگی با کدامیک از این موارد برابر است؟

- (۱) ۰ - ۱ - ۱ - ۰
- (۲) ۱ - ۰ - ۱ - ۰
- (۳) ۱ - ۰ - ۰ - ۱
- (۴) ۰ - ۰ - ۰ - ۱

۶۴- کدامیک از معادلات نمی تواند معادله سهمی باشد؟

$$y = 10x - 8x^2 \quad (۲)$$

$$y = -5 + x^2 \quad (۱)$$

$$y = 10x + 8x^2 \quad (۴)$$

$$y = -5 + 10x \quad (۳)$$

۶۵- اگر ضریب همبستگی بین دو متغیر $0/6$ و دو متغیر دیگر $0/3$ باشد میتوان گفت همبستگی دو متغیر اول «چندبرابر» قویتر از دو متغیر دوم است؟

- (۱) دوبرابر
- (۲) سه برابر
- (۳) چهار برابر
- (۴) نه برابر

۶۶- حجم نمونه چقدر باشد تا توزیع \bar{X} همان توزیع X شود؟

- (۱) $n = N$
- (۲) $n = 1$
- (۳) $n = 30$
- (۴) $n > 30$

۶۷- میانگین توزیع نمره های دانشجویان یک دانشکده ۵۲ و انحراف معیار آن ۱۵ است احتمال اینکه میانگین یک نمونه تصادفی 100 نفره کمتر از 55 باشد چقدر است؟

- (۱) ۰/۹۹۶۲
- (۲) ۰/۹۷۷۲
- (۳) ۰/۰۰۳۸
- (۴) ۱

۶۸- کدامیک از گزینه های ذیل صحیح است.

- (۱) میانگین هر نمونه n تایی با میانگین جامعه برابر است.
- (۲) قضیه حد مرکزی ، صرفاً مربوط به نمونه گیری از جوامع نامتقارن است.
- (۳) رفتار توزیع نمونه گیری \bar{P} از قضیه حد مرکزی تبعیت می کند.
- (۴) روش نمونه گیری خوشای از روش نمونه گیری گروهی دقیقتر است.

احتمال و کاربرد آن

۶۹- می خواهیم یک کمیته ۵ نفری از بین ۵ مدیر و ۳ کارشناس تشکیل دهیم احتمال اینکه در این کمیته ۳ مدیر و ۲ کارشناس انتخاب شوند چقدر است؟

- (۱) $\frac{1}{56}$
- (۲) $\frac{5}{28}$
- (۳) $\frac{15}{28}$
- (۴) $\frac{12}{56}$

۷۰- موشکی را برای زدن به منطقه ای با هدفهای A و B پرتاب می کنیم . اگر احتمال زدن به هدف A برابر $0/4$ و احتمال B برابر $0/5$ باشد و بدانیم که هدف A زده نشده باشد احتمال زدن B چقدر است .

- (۱) $\frac{1}{6}$
- (۲) $\frac{5}{6}$
- (۳) $\frac{2}{6}$
- (۴) $\frac{3}{4}$

۷۱-اگر تابع چگالی احتمال X بصورت زیر باشد A چقدر است.

$$F(X) = \begin{cases} \frac{3}{4}x^2 & 0 \leq x \leq 1 \\ A e^{-x} & x > 1 \end{cases}$$

$$-\frac{4}{3}e \quad (4) \quad \frac{4}{3}e \quad (3) \quad -\frac{3}{4}e \quad (2) \quad \frac{3}{4}e \quad (1)$$

۷۲- تیراندازی ۴۰٪ به هدف می‌زنند احتمال اینکه از ۵ تیر که رها می‌کنند ۳ تا به هدف اصابت کند چقدر است.

$$\frac{24}{100} \quad (4) \quad \frac{146}{625} \quad (3) \quad \frac{144}{625} \quad (2) \quad \frac{145}{625} \quad (1)$$

۷۳- فرض A و B در پیشامد از فضای نمونه ای Ω هستند، بطوری که $p(A \cap B) = 0.06$ ، $p(B) = 0.4$ ، $p(A) = 0.2$ و است. در اینصورت $p(A \cap \bar{B})$ برابر است با:

$$0.17 \quad (4) \quad 0.14 \quad (3) \quad 0.12 \quad (2) \quad 0.1 \quad (1)$$

۷۴- اگر تعداد مشتریانی که وارد یک بانک می‌شوند یک متغیر تصادفی پواسون با متوسط ۱۲ نفر در ساعت باشد مطلوب است احتمال اینکه فاصله زمانی بین ورود ۲ مشتری متوالی کمتر از ۱۵ دقیقه باشد:

$$1 - e^{-\frac{5}{4}} \quad (4) \quad e^{-3} \quad (3) \quad e^{-\frac{5}{4}} \quad (2) \quad 1 - e^{-3} \quad (1)$$

۷۵- گشتاور پنجم در جدول احتمال زیر کدام است؟

x_i	-2	1	3
$f(x_i)$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$

$$54 \quad (4) \quad 45 \quad (3) \quad 32/5 \quad (2) \quad 28/5 \quad (1)$$

۷۶- در توزیع مشترک X و Y زیر $Cov(X, Y)$ کدام است؟

		0	1	2	3
		0	$\frac{1}{8}$	$\frac{2}{8}$	$\frac{1}{8}$
X	0	$\frac{1}{8}$	$\frac{2}{8}$	$\frac{1}{8}$	
	1	$\frac{1}{8}$	$\frac{2}{8}$	$\frac{1}{8}$	0

$$\frac{1}{2} \quad (4) \quad -\frac{1}{2} \quad (3) \quad \frac{1}{4} \quad (2) \quad -\frac{1}{4} \quad (1)$$

۷۷- تولیدات کارخانه ای معیوب است احتمال اینکه سومین کالای کنترل شده اولین کالای معیوب باشد کدام است؟

$$0.052 \quad (4) \quad 0.142 \quad (3) \quad 0.128 \quad (2) \quad 0.082 \quad (1)$$

۷۸- کمیت تصادفی X بر طبق قانون هندسی بصورت $P(x) = P \cdot q^{x-1}$ که $X = 1, 2, 3, \dots$ توزیع شده است تابع مولد گشتاور برای قانون توزیع هندسی کدام است؟

$$m_x(t) = \frac{pe^t}{1+qe^t} \quad (4) \quad m_x(t) = \frac{pe^t}{1-qe^t} \quad (3) \quad m_x(t) = \frac{p}{1-qe^t} \quad (2) \quad m_x(t) = \frac{qe^t}{1-pe^t} \quad (1)$$

-۷۹- اگر متغیرهای تصادفی X و Y دارای تابع چگالی احتمال مشترک زیر باشد

$$F(x,y) = \begin{cases} 2 & 0 \leq x \leq y \leq 1 \\ 0 & \text{در غیر} \\ & \text{اینصورت} \end{cases}$$

در این صورت کدام رابطه صحیح است؟

$$p(x > y) = \frac{1}{2} \quad (4) \quad p(2x < y) = 1 \quad (3) \quad y \text{ مستقل اند} \quad (2) \quad p(x < y) = 1 \quad (1)$$

-۸۰- یک فاصله اطمینان ۹۵٪ برای میانگین یک جامعه نرمال که واریانس آن مشخص σ^2 است به صورت

$$\bar{x} - 1.96 \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{x} + 1.96 \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

(۲) تعداد نمونه را چهار برابر کنیم

(۴) σ را دو برابر کنیم

(۱) تعداد نمونه را دو برابر کنیم

(۳) σ را نصف کنیم

-۸۱- هرگاه در تابع توزیع دو جمله‌ای $E(X) = 20$ و $\sigma_X^2 = 12$ باشد تعداد آزمایش‌ها کدام است؟

$$(1) 80 \quad (2) 100 \quad (3) 60 \quad (4) 50$$

-۸۲- متغیر تصادفی ناپیوسته دارای $E(X) = 34$ و انحراف معیار 3 است میانگین کدام است؟

$$(1) 4 \quad (2) 3 \quad (3) 5 \quad (4) 6$$

فرایند های تصادفی

-۸۳- درصد محصولات کارخانه‌ای سالم است، احتمال اینکه از ۴ کالای خریداری شده از این کارخانه یک کالا سالم باشد چقدر است؟

$$(1) \frac{12}{625} \quad (2) \frac{16}{625} \quad (3) \frac{24}{625} \quad (4) \frac{5}{16}$$

-۸۴- اگر توزیع دو جمله‌ای $P = 0.25$ باشد. نمودار احتمال آن چه شکلی خواهد داشت؟

$$(1) \text{متقارن} \quad (2) \text{چوله به چپ} \quad (3) \text{چوله به راست} \quad (4) \text{به بستگی دارد}$$

-۸۵- تعداد سرکشیهای اضطراری به یک خط تولید دارای توزیع پواسون با متوسط ۳ سرکشی در روز است. احتمال اینکه در یک روز هیچ سرکشی‌ای صورت نگرفته باشد. چقدر است؟

$$(1) e^{-3} \quad (2) 3e^{-3} \quad (3) 2e^{-3} \quad (4) \frac{1}{3}e^{-3}$$

-۸۶- اگر $V(x+y) = \frac{5}{6}$ و $V(y) = \frac{2}{3}$ و $V(x) = \frac{1}{2}$ باشد. آنگاه کدام عبارت صحیح است؟

$$Cov(x, y) = \frac{1}{2} \quad (2) \quad Cov(x, y) = \frac{1}{3} \quad (1)$$

$$Cov(x, y) = -\frac{1}{4} \quad (4) \quad Cov(x, y) = -\frac{1}{6} \quad (3)$$

۸۷- به ازای چه مقداری از K این تابع میتواند تابع چگالی احتمال باشد؟

$$F(x) = \begin{cases} KX^2 & , \quad 0 < x < 4 \\ 0 & , \quad \text{در غیر اینصورت} \end{cases}$$

$\frac{1}{16}$	$\frac{3}{64}$	$\frac{3}{16}$	$\frac{1}{4}$
(۴)	(۳)	(۲)	(۱)

۸۸- میانگین و واریانس توزیع نرمال استاندارد به ترتیب (از چپ به راست) کدامند؟

- (۱) (۰ و ۰) (۴) (۰ و ۰) (۲) (۱ و ۱) (۳) (۱ و ۰) (۱)

۸۹- اگر اندازه دو نفر از جامعه نرمالی ، ۱۳ و ۱۹ و اندازه این دو نفر بر حسب متغیر استاندارد Z ، صفر و ۳ باشد، میانگین و انحراف معیار (به ترتیب از چپ به راست) کدامند؟

- (۱) (۶ و ۳) (۲) (۳ و ۱۹) (۳) (۲ و ۱۳) (۴) (۲ و ۱۹)

۹۰- اگر متغیر تصادفی X دارای توزیع نرمال با میانگین ۵۰ باشد ، $P(X \leq 50)$ کدام است؟

- (۱) صفر (۲) $\frac{1}{2}$ (۳) $\frac{3}{4}$ (۴) ۱

سری های زمانی

۹۱- کدامیک از گزینه های ذیل صحیح است؟

- (۱) هر سری زمانی همواره تغییرات فصلی دارد.

- (۲) مدل پیش بینی نمو هموار ساده «رونده» را در نظر می گیرد.

- (۳) مدل میانگین متحرک ساده مرکزی یک مدل پیش بینی کیفی است.

- (۴) از میانگین متحرک ساده مرکزی برای هموار سازی سری زمانی استفاده می شود.

۹۲- کدامیک از گزینه های ذیل صحیح است؟

- (۱) هر مدلی که MSE بزرگتری داشته باشد از صحت پیش بینی بالاتری برخوردار است

- (۲) مدل های اقتصاد سنجی یک مدل علی - معلولی است.

- (۳) مدل های ARIMA صرفاً برای سری زمانی غیرایستا استفاده می شوند.

- (۴) مدل های تلفیقی در پیش بینی فقط از ترکیب دو مدل خاص حاصل می شوند.

۹۳- در مدل نمو هموار ساده اگر $\alpha = 0.10$ باشد. تعداد دوره های سری زمانی حداکثر چقدر می تواند باشد؟

- (۱) ۱۰ (۲) ۱۹ (۳) ۲۰ (۴) ۵

۹۴- کدامیک از روش های ذیل جزء روش های کیفی است؟

- (۱) هلت - وینترز (۲) باکس و جنکینز (۳) دلفی (۴) میانگین متحرک وزنی

۹۵- کدامیک از مدل های ذیل جزء مدل های ARIMA نیست؟

- (۱) دلفی (۲) میانگین متحرک ساده (۳) رگرسیون ساده (۴) میانگین متحرک وزنی

۹۶- مقدار C در مدل هلت - وینترز دارای چه مقدار می تواند باشد؟

۱) کوچکتر از ۱ ۲) کوچکتر از ۱ و بزرگتر از صفر ۳) بزرگتر از صفر ۴) بین -۱ و +۱

۹۷- کدامیک از شاخص های ذیل قادر واحد است؟

MAD (۴) RMSE (۳) MAPE (۲) MSE (۱)

۹۸- فرض کنید در مدل هلت - وینترز $\bar{X}_{n-1} = 49/47$ و $\bar{X}_n = 49/47$ و $B = 0/4$ و $A = 0/3$ و $T_{n-1} = -0/31$ مقدار

T_n چقدر است؟

-۰/۴۹ (۱) -۰/۳۰۴ (۳) -۰/۲۵۱ (۲) -۰/۳۳ (۴)

۹۹- کدامیک از مدل های ذیل از صحت بالاتر برخوردارند؟

- ۱) تلفیق باکس جنکینز با هلت - وینترز
- ۲) تلفیق باکس جنکینز با میانگین متحرک
- ۳) تلفیق هلت - وینترز با نمو هموار ساده
- ۴) به معیار های صحت بستگی دارد

۱۰۰- داده های ذیل بیانگر تعداد تقاضای کامپیوترهای شخصی طی یک دوره ۵ ماهه است

ماه	فروردين	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد
تقاضا	۸۰	۱۰۲	۵۸	۸۰	۹۱

با استفاده از روش میانگین متحرک ، تقاضای ماه شهریور را پیش بینی کنید

۷۶/۳ (۱) ۸۰ (۲) ۸۳/۷ (۳) ۸۲/۲ (۴)