

## اثرات سمی دیازینون و سایر سموم ارگانوفسفره بر محیط زیست و منابع طبیعی

دیازینون به عنوان یک سم ارگانوفسفره شناخته می‌شود. از این سم به طور گسترده در برنامه‌های کشاورزی و باگبانی در جهت کنترل آفات و حشرات در محصولات زراعی، گیاهان زینتی، چمن، میوه و سبزیجات در سراسر جهان استفاده می‌گردد، همچنین برای سم پاشی ساختمان‌های مسکونی، کشاورزی و عمومی کاربرد فراوان دارد، شوینده‌های حاوی دیازینون برای کنترل انگل‌های خارجی گوسفند، گاو و سگ استفاده می‌شود.

استفاده بی‌رویه از سموم ارگانوفسفره باعث آلودگی محیط زیست و وارد شدن این سموم به چرخه غذایی و آب‌های زیرزمینی شده که نتیجه آن تأثیرات مخرب بر روی جانداران و برهم خوردگی اکوسیستم می‌باشد. در فصول خشک که ریزش باران کم است غلظت این سموم در طبیعت بیشتر شده و مخاطرات زیادی را در پی دارد.

با استفاده روزافرون از آفت کش‌ها، و حضور مزارع کشاورزی و منابع آبی در کنار یکدیگرف در نهایت حیات موجودات را بسته آب از جمله دوزیستان به خطر خواهد افتاد. از آنجایی که دوزیستان از حشرات تغذیه می‌کنند و حشرات برای مزارع مضر هستند، در صورت نابودی دوزیستان در اکوسیستم اختلال ایجاد خواهد و با افزایش حشرات مضر مزارع نیز دچار مشکلاتی می‌شوند که انسان به عنوان یکی از مصرف کنندگان بزرگ از این منابع دچار خسارت خواهد شد. از این رو شناخت سموم و تأثیر آن بر اکوسیستم و سیستم فیزیولوژیک دوزیستان به عنوان یک تعديل کننده اکوسیستم حائز اهمیت است.

حشره کشهای ارگانوفسفره که در گروه حشره کش‌های هیدروکربنهای کلردار قرار می‌گیرند، دارای قدرت اتحال کمی در آب هستند. قدرت اتحال آنها در چربیها به آنها این امکان را می‌دهد که در بافت‌های آبزیان جذب شوند و برای مدت طولانی باقی بمانند زیرا در مقابل اکسیداسیون مقاومت می‌کنند. حشره کش‌های ارگانوفسفره که حالت روغنی داشته و در آب حل نمی‌شوند از طریق پوست و آبشش‌ها جذب می‌شوند.

این حشره کش ها آنزیم استیل کولین استراز را که در تجزیه استیل کولین نقش دارد مهار می کنند. از عوارض

دیگر این گروه تغییر شکل ستون مهره ها، انقباض عضلات و کاهش مقاومت آبزیان در برابر بیماریهاست.

سموم ارگانو فسفره از جمله دیازینون باعث تولید رادیکال آزاد در سلول ها می گردد و به علت تولید این

رادیکال های آزاد، تغییرات ساختمانی در پروتئین های سلول و همچنین پراکسیداسیون چربی های غیر اشباع

داخل سلول را باعث می گردد، که عوارض آن نکروز سلول (از جمله سلول های کلیوی) و حتی تغییرات

نوپلاستیک (سرطان) است.

بسیاری از این سموم باعث کاهش تولید پروتئین ها و تخریب چربی ها می شوند (که رابطه مستقیم با پارامتر

های بیوشیمیایی دارند. بعضی از سموم ارگانوفسفره متابولیسم پروتئین ها را افزایش می دهند. کاهش متابولیسم

پروتئین را متعاقب مسمومیت با سموم ارگانوفسفره گزارش داده اند سموم ارگانوفسفره به طور کلی باعث

کاهش پروتئین تام و افزایش کلسترول تام سرم می گردد.

مطالعاتی که بر روی انسان صورت گرفته است تغییرات پارامتر های خونی متعاقب مصرف سموم

ارگانوفسفره را نشان داده است.

مطالعات انجام شده بر روی ماهی خاویار در معرض دیازینون نشان دهنده افزایش سطح اوره در خون می

باشد. بررسی اثرات سموم ارگانوفسفره نشان دهنده کاهش گلبول های قرمز و کاهش هموگلوبین است.

در پایان خلاصه ای از مشخصات، کاربردها و سمیت دیازینون آمده است:

نام و مشخصات ← کلاس: Insecticide

گروه: ارگانوفسفره

فرمول شیمیایی:  $C_{12}H_{21}V_2O_3PS$  (۳۰۴/۳۵)

نام تجاری:

Cromyest, Murphkoot Guard, Kentokil, Basudin Piacap (SC30%)

Flytrol and Knox out 2FM, 5ecto Antspray and Root Powdea, Da

Diagran, Dianon, Diazotol, Gordentoy, Nipsan, Dyazol, Dizion, Spectra

نام شیمیایی:

O,O-diethyle o-2-isopropy-6-metroyl-Pyrimidin-4-yl phos phorothioate

کاربرد ← ۱) نحوه تأثیر: حشره کش غیر سیستمیک با اثر تماسی و گوارشی و تنفسی

۲) موارد استفاده: دیازنیون به صورت پودر قابل تعليق جهت مبارزه با کرم سیب و مگس گلابی و سرخرطومی سیب و گلابی و خوش خوار انگور، جوانه خوار ک علیه سوسری جهت مبارزه با کرم سیب، پسیل گلابیف شپشک های پسته و مرکبات و نخیلات و آفات چغندر- گرانول ۱۰٪، علیه کرم ساقه خوار برنج.

۳) علیه کرم ساقه خوار برنج ۲ لیتر در هکتار برای نخیلات ۱/۵ تا ۲ لیتر، برای چغندر قند ۱ تا ۱/۵ لیتر، علیه کرم سفید ریشه درختان میوه و درختان جنگلی ۳ تا ۳/۵ لیتر، علیه لیر و شته درختان میوه پسیل گلابی و تریپس مو و شپشک پسته و مرکبات محلول ۱ در هزار ۶۰٪ EC، برای برنج ۱۵ kg گرانول ۱۰٪ SC در ۵ لیتر آب.

سمیت برای پستانداران ← LD50 for rat: 300-400 mg/kg

سمیت برای سایر موجودات ←

LD50 for Birds: 3/5-4/5 mg/kg

LC50 for fish: 2/6-23-4 mg/lit

EC50 for Daphnia: 1/4 mg/lit

پادرزه ← آتروپین- توکزوکدئین

فرمولاسیون کامل یا کاپ به صورت دیازنیون ۳۰٪ میکروکپسول سوسپانسیون می باشد. این سم در سال ۱۹۵۲ توسط لابراتوارهای سیباگایگی به بازار ارائه شد و در حال حاضر به صورت پودر جاذب رطوبت به صورت ۴۰۰ گرم در کیلوگرم، غلظت های امولسیون ۶۰۰، ۴۰۰، ۲۵۰ گرم در لیتر، پودرهای ۲۰ تا ۴۰ گرم در کیلوگرم، گرانول های ۳۰ تا ۱۴۰ گرم در کیلوگرم و آئرسول های ۲۰۰ گرم در لیتر موجود است.

## REFERENCES

- 1-Dutta, H. M., Meijer, H. J., Subletal effects of diazinon on the structure of the testis of blue gill, *lepisomis macrochirus*: a microscopic analysis. Environ. Pollut. . (2003) 125:355-360.
- 2-Hill, E. F. (2003), Wildlife toxicology of organophosphorus and carbamate pesticides. In: Hoffman, D. J., Rattner, B.A., Burton Jr. G. A., Cairns Jr. J . (Eds.), Handbook of Ecotoxicology. Lewis Publishers., Boca Raton. USA.
- 3- Garfitt, S. J., Jones, K., Mason, H. J., Cocker, J. (2002) Exposure to the organophosphate diazinon: data from a human volunteer study with oral and dermal doses. Toxicol. Lett. 134: 105-113.

4-Reigart, J. R., Roberts, J. R. (1999), Recognition and management of pesticide poisoning. (5th ed). United States Environmental Protection Agency. Washington, D.C, U.S.A.

5-Hassan, G. A., Salem, M. H., Abd-Allah, G. A., Shakere, N., Abo-Elezz, Z. (1988) Effect of organophosphorus (dimethoate) and pyrethroid (decamethrin) pesticides on plasma levels of cortisol and thyroxine, and on some haematological characteristics in growing male rabbits. Indian J. Anim. Sci. 58:1395-1401.

6-Kalender, Y., Uzunhisarcikli, M., Ogutcu, A., Acikgoz, F., Kalender, S. (2005) Diazinon on pseudocholinesterase activity and haematological indices in rats :The protective role of vitamin E. Environ. Toxicol. Pharmacol. 22:46-51.

7-OECD: (1984, 1987, 1990), Guiden lines for testing chemicals. No. 203 and 204. OECD, paris